

A-L

seye

26]

1850

CATALOGO
AVES OBSERVADAS
EN LA ISLA DE CUBA

HASTA OCTUBRE DE 1850

A-S

A-L

HARVARD UNIVERSITY



Library of the
Museum of
Comparative Zoology

FEB 13 1909

32941

A-L

= 1850
Lombard

CATALOGO

DE LAS

AVES OBSERVADAS EN LA ISLA DE CUBA

HASTA OCTUBRE DE 1850.

Careciendo de nombre vulgar muchas especies de nuestra ornitología, me ha parecido conveniente suplir su falta con otros de mi invencion, que son los que estan marcados con este signo *.

CATALOGO

DE LAS

AVES OBSERVADAS EN LA ISLA DE CUBA

HASTA OCTUBRE DE 1850.

CLASIFICADAS SEGUN EL SISTEMA ADOPTADO POR M. ALCIDES D'ORBIGNY

EN LA HISTORIA FISICA, POLITICA Y NATURAL DE CUBA

DE DON RAMON DE LA SAGRA.

ORDEN I.—ACCIPITRES.

FAMILIA I.—VULTURIDÆ.

Gén. I. CATHARTES, *Illig.*

C. Aura, (Vultur Aura, *Linn.*) Aura tiñosa.

FAMILIA II.—FALCONIDÆ.

Gén. I. POLYBORUS, *Vieill.*

P. vulgaris, *Vieill.* (Falco brasiliensis, *Linn.*)... Caraira.

Gén. II. CYMINDIS, *Cuv.*

C. uncinatus, *Illig.*..... Falco sonso. #

Gén. III. ROSTRAMUS.

R. sociabilis, *D'Orb.* (F. hamatus, *Illig.*)..... Caracolero. (1) #

Gén. IV. PANDION, *Sav.*

P. Haliaëtus, *Sav.* (F. Haliaëtus, *Linn.*)..... Guincho.

Gén. V. MORPHNUS, *Cuv.*

M. Urubitinga?, *Cuv.* (2)..... Batista.

Gén. VI. BUTEO, *Bechst.*

B. borealis (F. borealis), *Gmel.*..... *Gavilan coli-rojo.

B. latissimus ó pennsylvanicus, *Wils.*..... Halcon de monte.

Gén. VII. ASTUR, *Bechst.*

(1) D'Orbigny le da el nombre de *Guincho*.

(2) Segun noticias, el descripto por Lafresnaye con la denominacion de *M. mexicanus* es el adulto de mi especie.

Subg. ASTUR, *Cuv.*

- A. Cooperi, *Bonap.*..... *Azor americano.
 A. pileatus, *Pr. Wied.*..... Gavilan aplomado.

Subg. NISUS, *Cuv.*

- one spec* { A. fringilloides, *Vig.* (1)
 A. fuscus (F. fuscus), *Gmel.*..... *Cernícalo morado.

Gén. VIII. CIRCUS, *Bechst.*

- C. cyaneus (F. cyaneus), *Linn.*..... Gavilan sabanero.

Gén. IX. FALCO, *Linn.*

- F. communis ó peregrinus, *Gmel.*..... *Halcon.
 F. columbarius, *Linn.*..... Falconcito.
 F. sparverius, *Linn.*, y su variedad sparverioi-
 des, *Vig.*..... Cernícalo.

*Gen X Nauclerus Vig.*N. fucatus *Linn.*

FAMILIA III.—STRIGIDÆ.

Gén. I. OTUS, *Cuv.*

- * O. Siguapa, *D'Orb.*..... Siguapa.
 O. brachyotus (Strix brachyotus), *Linn.*..... *Cáرابو,

Gén. II. NOCTUA, *Sav.*

- * N. Sijú, *D'Orb.*..... Sijú.
 * N. nudipes, *Daud.*..... Sijú cuco ó Cotunto.

Gén. III. STRIX, *Sav.*

- * St. furcata, *Temm.*..... Lechuza.

*Fam. Ampelidæ.*Gen I. Bombycilla *Br.*B. carolinensis *Br.*

ORDEN II.—PASSERES.

FAMILIA I.—LANIADÆ.

Gén. I. VIREO, *Vieill.*

- V. olivaceus (Muscicapa olivacea), *Wils.* (2)... Bien-te-veo.
 V. flavifrons, *Vieill.*..... *Vireo de garganta amarilla.
 V. solitarius, *Vieill.*..... *Vireo solitario.
 V. noveboracensis (Musc. noveboracens.), *Gmel.* *Vireo cantarir.
 * V. Gundlachii, *Lemb.*..... *Petiboto.

FAMILIA II.—TURDIDÆ.

Gén. I. TURDUS, *Linn.* † *Swainsonii Cabanis.*

- T. rubripes, *Temm.*..... Zorzal de patas coloradas.
 T. minor, *Linn* (*nec. Bon, nec Aud*)..... *Malvis chico.
 T. mustelinus, *Linn.*..... *Zorzalito.
 T. carolinensis, *Licht.*..... Zorzal gato.

Gén. II. ORPHEUS, *Swains.*

- O. polyglottus (Turdus polyglottus), *Linn.*..... Sinsonte.
 * O. Sinsonte prieto.

Gén. III. SEIURUS, *Swains.* (3)

- S. aurocapillus, *Lath.*..... *Motolita coronada.
 * S. sulfurascens, *D'Orb.* = *noveboracensis.* *Pizpita.
 * S. major *Cabanis.*

FAMILIA III.—SYLVIDÆ.

Gén. I. SYLVIA, *Lath.*

- S. coronata, *Lath.*..... *Bijirita coronada...
 S. virens, *Lath.*

(1) Hasta ahora no hemos encontrado esta especie mencionada solo por Vigors.

(2) Las costumbres y distribución de colores observadas en nuestro *Bien-te-veo* pertenecen al *Vireo olivaceus* descrito en la obra de Audubon.(3) En la obra de la Sagra se lee *Sciurus*.

CATALOGO.

<i>S. pityophila</i> Gundl.	
<i>S. petechia</i> , Lath. (1)	*Bijirita de manigua.
<i>S. cærulescens</i> , Lath.	*Bijirita aplomada.
<i>S. pensilis</i> , Lath.	*Bijirita de garganta amarilla.
<i>S. Trichas</i> , Lath.	*Bijirita de frente negra.
<i>S. americana</i> , Lath.	Chinchilita.
<i>S. marítima</i> , Wils.	*Bijirita de costa.
<i>S. maculosa</i> , Lath.	*Bijirita manchada.
<i>S. æstiva</i> , Gmel.	Canario de manglar.
<i>S. discolor</i> , Vieill.	Mariposa galana.
<i>S. striata</i> , Wils.	*Monjita americana.

Gén. II. HELINAIA, Aud.

H. vermivora, Lath. *Gusanero.

H. Bachmanii, Aud. *Gorginegra.

H. chrysoptera ~~Linn~~ Linn

H. peregrina Wils.

FAMILIA IV.—TANAGRIDÆ.

Gén. I. EUPHONÆ, Desm.

E. musica (*Pipra musica*), Gmel. ~~Organista~~ *not ruban grecis*

Gén. II. TANAGRA, Linn.

T. Pretrei, Less. (2) Cabrero.

Gén. III. PYRANGA, Vieill.

P. æstiva (*Tanagra æstiva*), Gmel. *Cardenal acarminado.

P. rubra (*Tanagra rubra*), Linn. *Cardenal de alas negras.

FAMILIA V.—MUSCICAPIDÆ.

Gén. I. TYRANNUS, Cuv. *T. intrepidus* Vieill.

Pitirre intrepido.

* *T. magnirostris*, D'Orb. Pitirre real.

✓ *T. caudifasciatus*, D'Orb. Pitirre guatibere.

✓ *T. matulinus*, Vieill. (3) Pitirre.

T. Phæbe (*Muscicapa Phæbe*), Linn. (4) *stolidus* ~~Linn.~~ *Gosse.* Pitirre bobito.

Gén. II. MUSCICAPA, Linn., Cuv. *T. ornatus* Linn.

* *M. Elizabethæ*, Lemb. *is Philogony's Elizabethæ* Lemb. Ruiseñor.

✓ *M. fusca*, Gmel. *Lambeyæ* Gundl. *Moscareta parda.

M. virens, Gmel. Bombito.

M. pusilla, Swains. *Moscareta olivada.

M. rutililla, Gmel. *Coli-rubio.

Gén. III. SETOPHAGA, Swains.

S. mitrata (*Motacilla mitrata*), Linn. *Bijirita mitrada.

S. formosa (*Sylvia formosa*), Wils. *Bijirita agostera.

Gén. IV. CULICIVORA, Swains.

C. cærulea (*Motacilla cærulea*), Linn. *Bijirita azul,

Gén. V. MUSCIPETA, Cuv.

M. caribæa, D'Orb. Bobito.

FAMILIA VI.—HIRUNDIDÆ.

Gén. I. HIRUNDO, Linn., Cuv.

H. purpurea, Linn. Golondrina grande.

H. americana, Wils. *Golondrina bifurcada.

✓ *H. coronata*, Mus. ber. = *poeciloma* Gosse. *Golondrina coronada.

(1) Véase la obra de las *Aves de los Estados-Unidos* por M. Audubon, vol. II, p. 55, lám. 90.

(2) Esta especie descrita por Lessou fué reconocida por Lafresnaye y su observacion publicada en la *Revista Zoológica* de Guerin, segun noticias del Sr. D. Felipe Poey.

(3) El mismo que Audubon designa con el nombre de *Muscicapa dominicensis* de Briss.

(4) Respetando la autoridad de Mr. D'Orbigny dejamos el nombre de *Phæbe*, aunque varias razones fundadas en sus costumbres nos inclinan á creerla especie nueva.

- H. bicolor, Vieill..... *Golondrina verdosa.
 H. riparia, Linn..... *Golondrina ribariega.

Gén. II. CYPSELUS, Illig.

- * C. Iradii, Lemb. = *Tachornis phoeniceus gosse* *Vencejo cubano.

FAMILIA VII.—CAPRIMULGIDÆ.

Gén. I. CAPRIMULGUS, Linn.

- C. carolinensis, Br..... Guabairo grande.
 C. vociferus, Wils..... Guaraiba ó guabairo chico.

Gén. II. CHORDEILES, Swains.

- Ch. virginianus, Briss..... Berequetec ó Caracatey.

FAMILIA VIII.—FRINGILLIDÆ.

Gén. I. PASSERINA, Vieill.

- P. cyanea (Emberiza cyanea), Linn..... Azulejo.
 P. ciris (Emberiza ciris), Linn..... Mariposa.
 P. olivacea (Emberiza olivacea), Linn..... Tomeguin.
 P. collaris (Pyrrhula collaris), Vig..... Tomeguin del Pinar.

Gén. II. CARDUELIS, Cuv.

- C. pinus, Swains. (1)..... Tomeguin.

Gén. III. LINARIA, Bechst.

- L. caniceps, D'Orb (6)..... Tomeguin.

Gén. IV. PYRRHULA, Briss.

- P. nigra (Loxia nigra), Linn..... Negrito.

* Gén. V. FRINGILLA, Linn., Cuv.

- F. Cuba, Gerv. (2)..... *Pinzon cubano.

Gén. VI. EMBERIZA, Linn.

- E. pallida, Aud..... *Pardalillo.
 E. savanna (Fringilla savanna), Wils..... *Graminero.
 E. passerina (Fringilla passerina), Wils..... Chamberguito.

Gén. VII. DOLICHONYX, Swains.

- D. oryzivora (Emberiza oryzivora), Linn..... Chambergo.

FAMILIA IX.—LOXIADÆ.

Gén. I. COCCOBORUS, Swains.

- read the affix* C. ludovicianus (Fring. ludoviciana), Linn..... Degollado.
 C. cæruleus (Fringilla cærulea), Linn..... Azulejo real.

FAMILIA X.—STURNIDÆ.

Gén. I. STURNELLA, Vieill.

- hippocrepis Wagl.*
~~St. ludoviciana~~ (Sturnus ludovicianus), Linn..... Sabanero.

Gén. II. ICTERUS, Cuv.

- * I. humeralis, D'Orb..... Mayito. (3)
 I. assimilis, Gundl. (4)..... Chirriador.

Gén. III. XANTHORUS, Briss.

- X. Baltimore (Oriolus Baltimore), Linn..... Trupial.
 X. dominicensis (Oriolus dominicensis), Linn.. Solibio. (5)
 X. Bullorkii Swains.

(1) Nunca hemos visto esta especie en nuestros campos.

(2) Observado por Gervais en Santiago de Cuba, is a *Carduelis species from Southern America.*

(3) Tal es su nombre vulgar, y no el de *Tordo* como está escrito en la obra de la Sagra.

(4) Para que las especies de este Catálogo coincidan con las de D'Orbigny, aparecen aquí el *humeralis* y *assimilis* en el género *Icterus*.

(5) D'Orbigny le llama *Mayito* por equivocacion.

(6) *I believe it P. Ciris young male.*

Gén. IV. QUISCALUS, Vieill.

- Q. *versicolor*, Vieill. (~~Grac. Quiscala, Linn.~~) (1). Totí. *not Cuban species.*
 Q. *Barytus*, Vieill. (*Gracula Barita, Gmel.*)..... Chichinguaco.
 Q. *atroviolaceus*, D'Orb..... Totí.

FAMILIA XI.—CORVIDÆ.

Gén. I. CORVUS, Linn.

- C. *jamaicensis*, Gmel? (~~C. *americanus*, Aud.~~) ^{*nasicus Temm.*}... Cao.
 C. *minutus*, Gundl..... Cuervo.

FAMILIA XII.—CÆREBIDÆ.

Gén. I. CÆREBA, Vieill.

- C. *cyanea* (*Certhia cyanea*), Linn..... Aparecido de San Diego.

FAMILIA XIII.—SITTADÆ.

Gén. I. ANABATES, Temm.

- A. *Fernandinæ*, Lemb. ^{*is the Helmithereus*}..... Chillina.
^{*blaudus Licht.*}

FAMILIA XIV.—CERTHIADÆ.

Gén. I. MNIOTILTA, Vieill.

- M. *varia* (*Motacilla varia*), Linn..... Bijirita trepadora.

FAMILIA XV.—TROCHILIDÆ.

Gén. I. ORTHORHYNCHUS, Lacep.

- O. *colubris* (*Trochilus colubris*), Linn..... Colibrí.
 O. *Ricordii*, Gerv..... Zunzun.
 O. *Helena*, Gundl. ^{*olim, nunc Baathé, Gundl.*} *Zunzuncito.

FAMILIA XVI.—ALCYONIDÆ.

Gén. I. ALCEDO, Linn.

- A. *Alcyon*, Gmel..... Martin pescador.

FAMILIA XVII.—TODIDÆ.

Gén. I. TODUS, Linn.

- T. *Portoricensis*, Ad. Less. (2)..... Pedorrera.

ORDEN III.—SCANSORES.

FAMILIA I.—PICIDÆ.

Gén. I. PICUS, Linn.

- P. *principalis*, Linn..... Carpintero real.
 P. *varius*, Linn..... Carpintero roan.
 P. *percussus*, Temm..... Carpintero verde.

Gén. II. COLAPTES, Vig.

- C. *auratus* (*Cuculus auratus*), Linn..... Carpintero escapulario.
 C. *superciliaris* (*Picus superciliaris*), Temm... Carpintero jabado.
 C. *Fernandinæ*, Vig..... Carpintero churroso.

FAMILIA II.—CUCULIDÆ.

Gén. I. CŒCCYZUS, Vieill.

- C. *carolinensis*, Wils..... Arriero agostero.
 C. *erythrophthalmus*, Wils... *Arriero de costa.
 C. *seniculus*? Lath..... *Arriero de manglar.

(1) Es muy probable que el *versicolor* observado por Mr. Vigors, haya sido el Totí clasificado despues con el nombre de *atroviolaceus* por M. D'Orbigny.

(2) *Revue zoologique* Octobre, 1847, pág. 332, donde la describe Mr. Lafresnaye con la siguiente sinonimia:—"Todus Portoricensis, Ad. Lesson, 1838 (*Todus Portoricensis*, Less., compl. á Buff., p. 268).—*T. multicolor*, Gould, *Icones avium*, 1839.—*T. multicolor*, D'Orb., Ois. de Cuba, pl. 22."

Gen. II. SAUROThERA, Vieill.

✕ S. Merlini, D'Orb..... Arriero.

FAMILIA III.—CROTOPHAGIDÆ.

Gén. I. CROTOPHAGA, Linn.

C. ani, Linn..... Judío.

FAMILIA IV.—PSITTACIDÆ.

Gén. I. PSITTACUS, Linn.

Ps. leucocephalus, Aldr., Linn..... Cotorra.

✕ Gén. II. MACROCERCUS, Vieill.

M. tricolor, Vieill..... Guacamaya.

✕ Gén. III. CONURUS, Kuhl.

C. guyanensis (Psittacus guyanensis) Linn... Periquito.

FAMILIA V.—TROGONIDÆ.

Gén. I. TROGON, Linn.

✕ T. Temnurus, Temm..... Tocoloro.

ORDEN IV.—GALLINÆ.

FAMILIA I.—COLUMBIDÆ.

Gén. I. COLUMBA, Linn.

- ✕ C. migratoria L. (*is a accidental visitor*)... (1) ~~Torcaza salvaje.~~
 ✕ C. leucocephala, Gmel..... Torcaza de cabeza blanca.
 ✕ C. portoricensis, Temm..... Torcaza morada.
 ✓ C. inornata, Vig..... Torcaza cenizosa.
 ✓ C. cyanocephala, Gmel..... Perdiz.
 ✓ C. carolinensis, Gmel..... Rabiche.
 ✕ C. zenaida, Bonap..... Sanjuanera.
 ✓ C. mystacea, Temm..... Barbequejo.
 ✓ C. montana, Gmel. (2)..... Boyero.
 ✕ C. caniceps, Gmel..... Camao.
 ✓ C. passerina, Gmel..... Tojosita.

FAMILIA II.—TETRAODIDÆ.

Gén. I. ORTYX.

O. virginiana. (Tetrao virginianus), Linn..... Codorniz.

ORDEN V.—GRALLATORES.

FAMILIA I.—GRUIDÆ.

Gén. I. GRUS, Linn.

G. poliophæa, Wagl. (3)..... Grulla.

FAMILIA II.—ARDEIDÆ.

Gén. I. ARDEA, Linn.

A. Herodias, Linn..... Garcilote ceniciento.
 A. occidentalis, Aud..... Garcilote blanco.

(1) No podemos dar la descripción de esta especie, que según noticias es la mayor de todas.

(2) En la obra del Sr. de la Sagra tiene por nombre vulgar *Tórtola*, denominación que damos aquí á la *Columba risoria*.

(3) Mr. D'Orbigny cita en la pág 156 una nota referente á la *Grulla*, sin sospechar que se encuentra en esta Isla.

A. Egretta, <i>Gmel.</i> (1).....	Garzon.
A. cubensis, <i>Gundl.</i> = <i>Peali Bon.</i>	*Garza cubana.
A. rufescens, <i>Gmel.</i>	*Garza cuelli-roja.
A. candidissima, <i>Gmel.</i>	Garza blanca.
✗ A. leucogaster, <i>Gmel.</i>	*Garza pechi-blanca.
A. cærulea, <i>Catesb.</i>	Garza azul.
A. lentiginosa, <i>Swains.</i>	*Alcaraban.
A. virescens, <i>Linn.</i>	Aguaita-caiman.
✗ A. brunnescens, <i>Gundl.</i>	*Aguaita-caiman oscuro.
A. exilis, <i>Gmel.</i>	Garcita.
Gén. II. NYCTICORAX.	
N. vulgaris (<i>Ardea nycticorax</i>), <i>Linn.</i>	Guanabá lomi-negro.
N. violaceus (<i>Ardea violacea</i>), <i>Linn.</i>	Guanabá.
Gén. III. PLATALEA, <i>Linn.</i>	
P. Ajaja, <i>Linn.</i>	Sevilla.
Gén. IV. TANTALUS, <i>Linn.</i>	
T. loculator, <i>Linn.</i> (2).....	Cayama.

FAMILIA III.—PHŒNICOPTERIDÆ.

Gén. I. PHŒNICOPTERUS, *Linn.*

✗ Ph. americanus, <i>Seba.</i>	Flamenco.
--------------------------------------	-----------

FAMILIA IV.—SCOLOPACIDÆ.

Gén. I. IBIS, *Cuv.*

I. rubra (<i>Scolopax rubra</i>), <i>Linn.</i>	*Coco colorado.
I. alba, (<i>Tantalus albus</i>), <i>Gmel.</i>	Coco blanco.
I. falcinellus (<i>Tantalus falcinellus</i>), <i>Gmel.</i> <small>Guarauna</small>	Coco prieto.

Gén. II. NUMENIUS, *Briss.*

N. longirostris, <i>Wils.</i>	*Chorlito.
-------------------------------------	------------

Gén. III. LIMOSA, *Briss.*

L. hudsonica, <i>Lath.</i>	*Barga de rabadilla blanca.
L. fedoa, (<i>Scolopax fedoa</i> , <i>Linn.</i>).....	*Barga parda.

Gén. IV. SCOLOPAX, *Linn.*

Sc. Wilsonii, <i>Temm.</i> (3).....	Becasina.
-------------------------------------	-----------

Gén. V. LIMNODROMUS, *Wagl.*

L. noveboracensis (<i>Scolopax noveborac</i>), <i>Gmel.</i>	*Lagunera.
---	------------

Gén. VI. TOTANUS, *Briss.*

T. semipalmatus, <i>Wils.</i>	} Sarapico real.
Var. speculiferus, <i>Cuv.</i>	
T. vociferus, <i>Wils.</i>	*Sarapico griton.
T. flavipes, <i>Wils.</i> (<i>Scolopax flavipes</i> , <i>Gmel.</i>)..	*Sarapico pati-amarillo.
T. solitarius, <i>Wils.</i>	*Sarapico solitario.
T. macularius, <i>Wils.</i>	*Sarapico mosqueado.
✗ T. longicaudus (<i>Tringa longicauda</i>), <i>Bech.</i> (4).	*Sarapico sabanero.
T. himantopus (<i>Tringa himantopus</i>), <i>Bonap.</i>	*Sarapico zancudo.

(1) Adoptamos el nombre de *Egretta* persuadidos de que Mr. D'Orbigny reunió dos especies distintas bajo el nombre de la Garza europea *A. alba*, y colocamos la *Herodias* en primer lugar para bajar sin interrupcion de la *occidentalis* á la *cærulea*.

(2) Mr. D'Orbigny atribuyó el nombre de *Coco* á esta especie, equivocado por el blanco y negro del plumage, pues solo de este modo se comprende que haya dejado de mencionar el *Coco blanco*, tan comun en la Isla.

(3) Mudamos su nombre específico persuadidos de que este es el que pertenece á la especie cubana.

(4) Aud. pone el *T. longicauda*, *Himantopus*, *Semipalmata* y *A. calidris* en el género *Tringa*.

Gén. VII. HEMIPALAMA, *Bonap.*

- one spec* { *H. semipalmata* (*Tringa semipalmata*), *Wils*... *Sarapico pechi-blanco.
 { *H. minor*, *Gundl*..... *Sarapiquito.

Gén. VIII. TRINGA, *Temm.*

- T. pectoralis*, *Bonap*..... *Sarapico de rabadilla negra.
T. Schinzii, *Bonap*..... *Sarapico de rabadilla blanca.
T. rufescens, *Vieill*..... *Sarapico pajizo.
T. pusilla, *Wils*. (1)..... *Sarapico galano.

Gén. IX. STREPSILAS, *Illig.*

- St. Interpres* (*Tringa Interpres*), *Linn*..... *Sarapico escapulario.

Gén. X. ARENARIA, *Bechst.*

- A. calidris*..... *Sarapico blanquecino.

Gén. XI. HIMANTOPUS, *Briss.*

- H. nigricollis*, *Vieill*..... *Zancudo.

Gen XII Recurvirostra Linn

R. americana *Linn*. FAMILIA V.—CHARADRIDÆ.Gén. I. HÆMATOPUS, *Linn.*

- H. palliatus*, *Temm*..... *Ostrero americano.

Gén. II. VANELLUS, *Briss.*

- V. squatarolus* (*Tringa squatarola*), *Linn*..... *Pluvia! grande.

Gén. III. CHARADRIUS, *Linn.*

- Ch. marmoratus*, *Temm*..... *Frailecillo jaspeado.
Ch. vociferus, *Linn*..... Frailecillo.
Ch. Wilsonius, *Ord*..... *Frailecillo cabezon.
Ch. semipalmatus, *Kaup*..... *Frailecillo chico.
Ch. melodus *Ord*.

FAMILIA VI.—RALLIDÆ.

Gén. I. PARRA, *Linn.*

- P. jacana*, *Linn*..... Gallito.

Gén. II. ARAMUS, *Vieill.*

- A. Guaranaa* (*Scolopax Guaranaa*), *Gmel*... Guareao.

Gén. III. RALLUS, *Linn.* *R. virginianus* *Linn*

- R. longirostris*, *Gmel* *R. crispatus* *Gmel* *R. elegans* *Aud*..... *Gallinuela parda.

- R. variegatus*, *Gmel*..... Eseribano. ✕

- R. carolinus*, *Linn*..... *Gallinuela gorginegra.

- R. minutus*..... *Gallinuela chiquita. ✕

Gén. IV. PORPHYRIO, *Briss.* *R. jamaicensis* *Briss.*

- P. martinica* (*Fulica martinica*), *Linn*..... *and other new species.*
 Gallareta azul.

Gén. V. GALLINULA, *Lath.*

- G. galeata*, *Pr. Wied.* (2)..... Gallareta de pico colorado.

Gén. VI. FULICA, *Linn.*

- F. americana*, *Gmel.* (3)..... Gallareta de pico blanco.

(1) Es la especie que Mr. D'Orbigny menciona bajo la denominacion de *Tringa Temminckii*; pero como Mr. Audubon pone en duda que la *pusilla* sea igual á la *Temminckii*, hemos suprimido este último nombre en la duda de que ambos sean sinónimos.

(2) Persuadidos de que hay alguna diferencia entre la *chloropus* de Linn. y la *galeata* del Pr. Wied., preferimos el último nombre, adoptado tambien por Wilson.

(3) Parece que Mr. D'Orbigny no reconoció nuestra especie, que difiere de la *atra* en el color del pico.

ORDEN VI.—NATATORES.**FAMILIA I.—COLYMBIDÆ.**Gén. I. COLYMBUS, *Briss.* (Podiceps, *Lath.*)

- ✧ C. dominicensis, *Briss.*..... Saramagullon chico.
 C. carolinensis, *Briss.*..... Saramagullon grande.

FAMILIA II.—ANATIDÆ.Gén. I. ANSER, *Briss.*

- A. hyperboreus (Anas hyperborea), *Linn.*..... Guanana blanca.
 A. albifrons, *Bechst.*..... Guanana prieta.

Gén. II. ANAS, *Linn.*Subg. ANAS, *Bechst.* *A. cyanoptera* *Vieill.*

- A. sponsa, *Linn.*..... Huyuyo.
 ✧ A. arborea, *Linn.*..... Yaguaza.
 A. acuta, *Linn.*..... Pato pescueci-largo.
 A. americana, *Lath.*..... Labanco.
 A. clypeata, *Linn.* (1)..... Cuchareta.
 A. discors, *Linn.*..... Pato de Florida.
 A. carolinensis, *Linn.*..... Pato serrano.
 A. boschas, *Linn.*..... Pato ingles.

Subg. FULIGULA, *Leach.* *A. Valisneriana* *Wils.*

- A. mariloides, *Vig.* (2)..... Pato morisco.
 A. rufitorques, *Bonap.*..... *Pato negro.
 A. rubida, *Wils.*..... *Pato rojo.
 ✧ A. spinosa, *Linn.*..... *Pato espinoso.

Gén. III. MERGUS, *Linn.* *A. albola* *Linn.*

- M. cucullatus, *Linn.*..... *Mergeo.

FAMILIA III.—PELECANIDÆ.Gén. I. PELECANUS, *Linn.*

- P. fuscus, *Linn.*..... Alcatraz.

Gén. II. PHALACROCORAX, *Briss.*

- Ph. floridanus, *Aud.* (3)..... Corua.
 ✧ Ph. Townsendi, *Aud.* } *favosus* *Gundl. mss.*..... Cuerva.
 Ph. resplendens, *Aud.* } *Corua chiquita.

Gén. III. PLOTUS, *Linn.*

- Pl. Anhinga, *Linn.*..... Marbella.

Gén. IV. SULA, *Briss.*

- ✧ S. fusca, *Vieill.*..... Pájaro bobo.

Gén. V. FREGATA, *Briss.*

- F. aquila (Pelecanus aquila), *Linn.*..... Rabihorcado.

Gén. VI. PHAETON, *Linn.*

- Ph. æthereus, *Linn.*..... Rabijunco.

(1) Mr. D'Orbigny la publicó con el nombre de *A. mexicana* *Gmel.* que tambien le pertenece.

(2) Mr. Vigors distingue con el nombre de *mariloides* una especie enteramente igual al *marila* pero de menores dimensiones. Nuestro amigo Gundlach ha observado la primera, y como ambas se encuentran en N.-América suponemos que la mencionada por D'Orbigny habrá sido esta *mariloides*.


(3) Suprimimos el *graculus* de Bonap. por las razones espuestas en la pág. 119.

FAMILIA IV.—STERNIDÆ.

Gén. I. LARUS, <i>L. argentatus</i> Br.	
<i>L. marinus?</i> Linn.....	*Gaviota de manto negro.
<i>L. atricilla</i>	Gallego.
Gén. II. STERNA, Linn.	
<i>St. stolidus</i> , Linn.....	Gaviota boba.
<i>St. cayennensis</i> , Gmel.....	*Gaviota de pico rojo.
<i>St. fuliginosa</i> , Gmel.....	G. monja.
<i>St. anglica</i> , Mont.....	Gaviota de pico grueso.
<i>St. nigra</i> , Linn.....	Gaviota negra.
<i>St. minuta</i> , Linn. <i>argentatus</i> P. Russ.....	Gaviota chiquita.
<i>St. cantinaca</i> Gmel.	







ERNST MAYR LIBRARY



3 2044 110 324 944

